

ODDZIAŁ w Rawie Mazowieckiej

KOMUNIKAT z dnia 13.03.2008r.

O OCHRONIE WIŚNI I CZEREŚNI PRZED RAKIEM BAKTERYJNYM

I.Faza nabrzmiewania pąków.

Dawka kg, l/ha

CHAMPION 50 WP	3,0
FUNGURAN - OH 50 WP	3,0
MAG 50 WP	3,0
MIEDZIAN 50 WP/50 WG	3,0
MIEDZIAN EXTRA 350 SC	3,0

II.Faza kwitnienia – opryskiwać odmiany wrażliwe tylko w czasie opadów

CHAMPION 50 WP	1,5
FUNGURAN - OH 50 WP	1,5
MAG 50 WP	1,5
MIEDZIAN 50 WP/50 WG	1,5
MIEDZIAN EXTRA 350 SC	2,0

III. Okres opadania liści-stosować preparaty i dawki jak w I terminie

Odmiany mało wrażliwe opryskiwać na początku, a wrażliwe dwukrotnie, na początku i pod koniec opadania liści.

UWAGA ! Ściśle przestrzegać informacji zawartych w etykiecie – instrukcji stosowania.

Fungicydy miedziowe ograniczają występowanie brunatnej zgnilizny drzew pestkowych.