

KOMUNIKAT z dnia 13.03.2008r.

O WIOSENNYM ZWALCZANIU MIOTŁY ZBOŻOWEJ W ZBOŻACH OZIMYCH

Masowe występowanie MIOTŁY ZBOŻOWEJ znacznie obniża plony zbóż (próg szkodliwości 10-15 szt. na 1 m²). Jeżeli miotła nie była zwalczana chemicznie jesienią lub na przedwiośniu należy zaraz po ruszeniu wegetacji opryskiwać plantacje jednym z wymienionych środków ochrony roślin:

Dawka w kg, g l, na 1 ha

	<i>Pszenica oz.</i>	<i>Jęczmień oz.</i>	<i>Pszenżyto oz.</i>	<i>Żyto</i>
APYROS 75 WG	26,5 g	-	26,5 g	-
ATLANTIS 04 WG	0,15 – 04 kg	-	0,15 – 04 kg	0,15 kg
ATTRIBUT 70WG	60 g	-	60 g	-
CHISEL 75 WG	60 g	60 g	60 g	60 g
DICURAN 80 WP (lub jego odpowiedniki)	2,0	2,0	2,0	-
GLEAN 75 WG	10 - 15 g	10 - 15 g	10 - 15 g	10 - 15 g
HUZAR 05 WG	150-200g	-	150-200g	150-200g
PUMA Universal 069 EW	1,0 - 1,2	-	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2

UWAGA: Ścisłe przestrzegać informacji zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania preparatów.

GLEAN 75 DF - nie stosować na glebach o pH powyżej 7,5. ATTRIBUT 70WG ogranicza rozwój perzu właściwego.