

**ODDZIAŁ w Rawie Mazowieckiej**

# **KOMUNIKAT z dnia 2.04.2008**

## **O zwalczaniu parcha jabłoni w okresie od pęknięcia pąków do fazy mysisz uszek.**

W celu stałego zabezpieczenia pąków przed zakażeniem przez parch jabłoni należy zapobiegawczo wykonać opryskiwanie jednym z niżej podanych środków ochrony roślin w odstępach 5-7 dni w miarę rozwoju tych pąków.

Dawka kg, l/ha

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>MIEDZIAN EXTRA 350 S.C.</b>       | <b>1,5-2,0</b> |
| <b>CUPROXAT 345 S.C.</b>             | <b>3,0</b>     |
| <b>MAG 50 WP</b>                     | <b>0,75</b>    |
| <b>MAGIC CAP 45 WP</b>               | <b>2,5</b>     |
| <b>KOCIDE 101 WP</b>                 | <b>1,5</b>     |
| <b>CHAMPION 50 WP</b>                | <b>0,75</b>    |
| <b>FUNGURAN-OH 50 WP</b>             | <b>0,75</b>    |
| <b>KAPTAN ZAW.50 WP/CAPTAN 50 WP</b> | <b>3,0-4,5</b> |
| <b>MERPAN 50 WP</b>                  | <b>3,0-4,5</b> |
| <b>MERPAN 80 WG</b>                  | <b>1,9</b>     |
| <b>DITHANE M-45 80WP</b>             | <b>3,0-4,5</b> |
| <b>DITHANE NEO TEC 75 WG</b>         | <b>3,0-4,5</b> |

**UWAGA!** Środki miedziowe zaleca się stosować w fazie pęknięcia pąków do fazy ukazywania się pierwszych liści, ograniczają występowanie zarazy ogniowej.

**UWAGA ! Ściśle przestrzegać informacji zawartych w etykiecie - instrukcji stosowania.**

Opracowano:  
D. Skierniewice 2008 r.  
<http://www.piorin.gov.pl/>