

ODDZIAŁ w Rawie Mazowieckiej

KOMUNIKAT z dnia 15.04.2008 r.

O zwalczaniu parcha jabłoni w okresie od fazy zielonego pąka do fazy różowego pąka.

W celu stałego zabezpieczenia pąków przed zakażeniem przez parch jabłoni należy zapobiegawczo wykonać opryskiwanie jednym z niżej podanych środków ochrony roślin w odstępach 5-7 dni, w zależności od szybkości rozwoju drzew i warunków atmosferycznych.

	Dawka kg, l/ha
CHORUS 75 WG*	0,2
DELAN 700 WG	0,5-0,75
MYTHOS 300 SC*	1,0-1,5
W/w środki działają poinfekcyjnie, stosować z dodatkiem preparatu kontaktowego.	
ARDENT 500 SC	0,2
DISCUS 500 WG	0,2-0,3
ZATO 50 WG	0,15

W/w środki stosować w mieszaninie z fungicydami o innym mechanizmie działania.

KAPTAN ZAW.50 WP/CAPTAN 50 WP	3,0-4,5
MERPAN 50 WP	3,0-4,5
MERPAN 80 WG	1,9
SYLLIT 65 WP/CARPENE 65 WP *	1,5-2,0

UWAGA! Syllit, Mythos, Chorus, Zato, Discus, Ardent- nie stosować częściej niż 2 razy w sezonie.
*- stosować w sadach, w których nie stwierdzono odporności na grzyba.

UWAGA ! Ściśle przestrzegać informacji zawartych w etykiecie - instrukcji stosowania.