

ODDZIAŁ w Rawie Mazowieckiej

KOMUNIKAT z dnia 23.04.2008 r.

O zwalczaniu zwójek liściowych i innych gąsienic zjadających liście oraz mszycy jabłoniowej.

W sadach, w których stwierdza się liczne występowanie wymienionych szkodników należy przeprowadzić zabieg pod koniec zielonego pąka lub na początku różowego pąka stosując jeden z podanych preparatów:

	Dawka w l, kg/ ha	Prewencja
Calypso 480 SC	0,2	-
Fastac 100 EC	0,15 - 0,18	1 godz.
Mospilan 20 SP	0,2	-
Nurelle D 550 EC	1,5	3 dni
Owadofos 540 EC	2,25	3 dni
Reldan 400 EC	1,5	3 dni
Steward 30 WG	0,17-0,2	-
Sumithion Super 1000 EC	1.125	3 dni

Wszystkie środki z wyjątkiem preparatu Steward zwalczają również mszyce.

Prepataty selektywne do zwalczania mszycy jabłoniowej.

Pirimor 500 WG	0,75	6 godz.
Pirimix 100 PC	1,5	6 godz.

UWAGA !Ściśle przestrzegać informacji zawartych w etykiecie - instrukcji stosowania.