

ODDZIAŁ w Rawie Mazowieckiej

KOMUNIKAT z dnia 23.04.2008 r.

O zwalczaniu przędziorków w sadach

Rozpoczął się wylęg larw przędziorków z jaj zimowych. Należy niezwłocznie wykonać zabieg stosując jeden z podanych preparatów:

	<u>Dawka kg, l/ha</u>
Apollo Plus 060 OF	3,0
Apollo 500 SC (jabłoń, grusza, śliwa)	0,4
Envidor 240 SC (jabłoń)	0,4
Nissorun 050 EC	0,9
Promanal 60 EC	2 %
Paroil 95 SC	2 %
Treol 770 EW	1,5%

Preparaty te, oprócz środka-Envidor 240 SC nie działają na przędziorki zimujące w postaci dorosłej (np. przędziorek chmielowiec). W sadach, w których nie stosowano w/w preparatów, a ilość przędziorków wzrosła do 3 i więcej sztuk na liść, należy wykonać zabieg najpóźniej w fazie różowego pąka jednym z niżej podanych środków:

	<u>Dawka kg, l/ha</u>	<u>Prewencja</u>
Magus 200 SC	0,5-0,7	1 godz
Ortus 05 SC (jabłoń)	1,0	-
Pennstyl 600 SC	0,5-0,6	-
Pennstyl 25 WP	1,2-1,5	-

UWAGA !Ściśle przestrzegać informacji zawartych w etykiecie - instrukcji stosowania.