

ODDZIAŁ w Rawie Mazowieckiej

KOMUNIKAT z dnia 13.05.2008 r.

O zwalczaniu szarej pleśni na truskawce

W celu ochrony truskawek przed **szarą pleśnią** należy wykonać opryskiwania co 5-7 dni:

- **na początku kwitnienia** (10% kwiatów w stadium białego pąka),
- **w czasie pełni kwitnienia** oraz
- **pod koniec kwitnienia** gdy z 10 % kwiatów opadną płatki korony stosując przemiennie jeden z niżej podanych preparatów:

	Dawka kg, l/ha	karencja
FOLPAN 80 WG	2,0	3 dni
MYTHOS 300 SC	1,5	7 dni
POMARSOL FORTE 80 WG	4,0	7 dni
PREWEKS 500 SC/STOPER 500 SC	1,5	5 dni
RONILAN 500 SC	1,5	10 dni
ROVRAL FLO 255 SC	2,5-3	10 dni
SADOPLON 75 WP	4-5	7 dni
SIGNUM 33 WG	1,8	3 dni
SWICH 62,5 WG	0,8-1	3 dni
TELDOR 500 SC	1,5	1 dzień
THIRAM Granuflo 80 WG	1,5	7 dni

UWAGA !Ściśle przestrzegać informacji zawartych w etykiecie - instrukcji stosowania.

Koszenie i usuwanie liści truskawek po zbiorze ogranicza wyst. chorób i ułatwia zwalczanie szkodników. **Koszenie liści wykonać tylko na plantacjach w dobrej kondycji, najpóźniej 2 tygodnie po zbiorze.** Niektóre fungicydy ograniczają także występowanie innych chorób.

Opracowano:

D. Skierniewice 2008 r.

<http://www.piorin.gov.pl/>