

ODDZIAŁ w Rawie Mazowieckiej

KOMUNIKAT z dnia 13.05.2008 r.

O zwalczaniu owocnicy jabłkowej

W sadach, w których w ubiegłym roku stwierdzono liczne uszkodzenia owoców przez tego szkodnika należy pod koniec opadania płatków kwiatowych, (początku wylęgania się larw) wykonać zabieg jednym z preparatów:

	Dawka kg, l/ha	Prewencja
Actara 25 WG	0,16-0,2	6 godz.
Basudin 600 EW	0,9	24 godz.
Calypso 480 SC	0,1	-
Mospilan 20 SP	0,125	-
Owadofos 540 EC/Sumithion 500 EC	2,25	3 dni
Owadox 1000 EC	1,125	7 dni
Sumithion Super 1000 EC	1,125	3 dni

UWAGA !Ściśle przestrzegać informacji zawartych w etykiecie - instrukcji stosowania.

Zabieg przeciwko owocnicy jabłkowej należy wykonać po opadnięciu około 80 % płatków kwiatowych

Próg szkodliwości 20 odłowionych owocnic średnio na 1 białą pułapkę.

Preparaty: Owadofos i Sumithion zwalczają również skorupika jabłoniowego.

Przed przystąpieniem do opryskiwań należy wykosić kwitnące chwasty pod drzewami.

Opracowano:

D. Skierniewice 2008 r.

<http://www.piorin.gov.pl/>