

ODDZIAŁ w Rawie Mazowieckiej

KOMUNIKAT z dnia 03.06.2008 r.

O ZWALCZANIU NASIONNICY TRZEŚNIOŲKI

Rozpoczął się lot much nasionnicy trześniówki. W rejonach zagrożonych masowym występowaniem tego szkodnika należy przeprowadzić 1 - 3 opryskiwanie tylko późno dojrzewających odmian czereśni i wiśni jednym z podanych preparatów:

	Dawka kg, l/ha	Karencja
BASUDIN 600 EW	0,9 l	10 dni
*DECIS 2,5 EC	0,45 - 0,6 l	7 dni
*FASTAC 100 EC	0,15 - 0,18	7 dni
GROT 250 EC	2,25	10 dni
MOSPILAN 20 SP	0,125	14 dni
OWADOFOS 540 EC	2,25	21 dni
OWADOX 1000 EC	1,125	7 dni
CALYPSO 480 SC	0,1	14 dni

Dokładny termin zwalczania **nasionnicy trześniówki** najlepiej można ustalić na podstawie obserwacji odłowu much na żółte tablice lepowe. Opryskiwanie należy wykonać po 2-3 dniach regularnego odłowu much na pułapki. Dalsze 1 - 2 zabiegi przeprowadzić w okresie intensywnego lotu much.

* - pyretroidy stosować w temp. poniżej 20°C i tylko jeden raz w sezonie

UWAGA !Ściśle przestrzegać informacji zawartych w etykiecie - instrukcji stosowania.
Ściśle przestrzegać okresu karencji.