

ODDZIAŁ w Rawie Mazowieckiej

KOMUNIKAT z dnia 12.06.2008

O zwalczaniu owocówki jabłkóweczki I pokolenia rozwoju jaj w fazie "czarna główka".

W sadach, w których nie stosowano wcześniej insektycydów podczas masowego lotu motyli w dniach 12-14.06.2008 r.. należy przeprowadzić opryskiwanie jabłoni przeciwko owocówce jabłkóweczce w fazie rozwoju tzw. „czarnej główki” jednym z poniżej podanych preparatów:

	Dawka kg, l/ ha	Prewencja	Karencja
Basudin 600 EW	0,9	24 godz.	14 dni
Grot 250 EC	2,25	5 dni	14 dni
Owadofos 540 EC/Sumithion 50 EC	2,25	3 dni	21 dni
Owadox 1000 EC	1,125	3 dni	14 dni
Sumithion Super 1000 EC	1,125	3 dni	21 dni
Carpovirusine SC	1,5	-	-
SpinTor 480 SC	0,3-0,42	3 godz.	7 dni

UWAGA !Ściśle przestrzegać informacji zawartych w etykiecie - instrukcji stosowania.

W razie wznowienia w drugiej połowie czerwca odłowów motyli owocówki jabłkóweczki w pułapki feromonowe- zabieg należy powtórzyć. Przed opryskiwaniem wykosić kwitnące chwasty pod drzewami . Nie dopuścić do naniesienia cieczy roboczej na sąsiednie plantacje warzyw, jagodników czy też innych upraw.