

ODDZIAŁ w Rawie Mazowieckiej

KOMUNIKAT z dnia 18.06.2008 r.

O zwalczaniu macznika rzekomego na plantacjach cebuli z siewu ozimego, cebuli dymki i plantacjach nasiennych

Należy niezwłocznie przystąpić do opryskiwania roślin stosując jeden z preparatów:

	dawka na kg, l/ha	karencja
Acrobat MZ 69 WG	2-2,5	14 dni
Altima 500 S.C.	0,5	28 dni
Amistar 250 SC	0,8	14 dni
Bisept 33 SL	1-1,5	-
Bravo 500 SC	2 - 2,5	14 dni
Curzate M 72,5 WP/WG	2 - 2,5	14 dni
Dithane NeoTec 75 WG	2 - 3	14 dni
Galben M 73 WP	2 - 2,5	14 dni
Grevit 200 SL (0,5%)	1,5	-
Gwarant 500 SC	2,5	14 dni
Indofil 80 WP	2,5	14 dni
Mildex 711,9 WG	2,5	14 dni
Polyram 70 WG	2	5 dni
Ridomil Gold MZ 68 WP	2,5	14 dni
Sancozeb 80 WP	2 - 3	14 dni
Tanos 50 WG	0,7	11 dni
Tattoo C 750 S C	2,5	7 dni
Toska 72,5 WP	2-2,5	14 dni
Valbon 72 WG	1,75-2	14 dni

+ zwilżacz w/g etykiety do wszystkich fungicydów.

UWAGA ! Ściśle przestrzegać informacji zawartych w etykiecie - instrukcji stosowania.

Pierwsze zabiegi wykonać po wystąpieniu objawów choroby na cebuli nasiennej lub z dymki lub wg sygnalizacji. Preparaty z grupy Ridomil oraz Galben stosować maksymalnie 2 razy w sezonie. **Opryskiwać co 7 - 10 dni.**